

با استفاده از محصول آنتی سپتیک بادی پرپ / بادی پرپ C



قبل از هر گونه برش پوست از خشک شدن کامل موضع اطمینان حاصل کنید.



حداقل ۳ دقیقه صبر کنید تا عملیات ضد عفونی تکمیل شود.



برای آماده سازی پوست محلول را در داخل یک رسیور ریخته و با کمک گاز استریل و پنس به شیوه پرپ جراحی (از مرکز به بیرون) پوست را ضد عفونی کنید. برای نصب کترها با روش فوق، یا اسپری روی موضع از فاصله نزدیک (۵cm)، پوست را آماده سازی کنید.



ابتدا سطح پوست را از هر گونه آلودگی مانند مواد صابونی، کرم، پماد و ... پاکسازی نمایید.

- از استفاده همزمان این محصول با سایر ترکیبات ضد عفونی کننده مانند پوویدون آیوداین (بتابدین) اجتناب شود.

مزایای محصول:

- فرمول منتخب سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای پرپ پوست بر پایه ۲٪ کلرهگزیدین و ۷۰٪ ایزوپروپانول
- دارای خاصیت ضد عفونی کننده سریع و ماندگار می باشد.
- طیف وسیعی از عوامل بیماریزا در فرآیند ضد عفونی توسط این محصول از بین می روند.
- این محصول در مقایسه با بتادین و ترکیبات ید دار، کاملاً ایمن بوده و فاقد جذب پوستی و عوارض جانبی دیگر می باشد.